

Opal

Kweker: Statens Trädgårdsförksökning, Alnarp, Zweden. Ouderdom 1925. Gewonnen uit een kruising van Early Favourite met Reine Claude d'Oullins. Geïntroduceerd in 1946

De boom is een matig tot sterke groeier. Op de boom kan een normale snoei toegepast worden. Boom goed open snoeien om Moniliarot te beperken

Weinig gevoelig voor loodglans en kanker. Monilliavruchtrot: Rottende vruchten met bruingele ringen ontstaan wanneer er geen vruchtdunning toegepast wordt en de vruchten tegen elkaar blijven hangen.



De bloei is in april met veel bloemen. Kwaliteit stuifmeel is goed, is zelffertil. Opal draagt soms meer vruchten dan de takken kunnen dragen. Om inscheuren en zelfs afbreken van de takken te voorkomen moet eind juni het teveel aan vruchten worden weggenomen. Daarmee wordt de kans op Moniliarot verkleind. De ziekte verspreidt zich voornamelijk door pruimen die tegen elkaar hangen.

De oogst is vroeg en rijk aan vruchten. *Prunus domestica* 'Opal' produceert kleine pruimen die paars van kleur zijn op een geelrode achtergrond. Het geelgroene vruchtvlees is sappig en heerlijk van smaak. Het is een vroeg rijpende pruim waarvan de vruchten kunnen worden geplukt vanaf begin augustus. Dit ras wordt voor algemene teelt aanbevolen. Het is een fijne handpruim, maar ook uitermate geschikt voor compote en jam. Daarnaast komt de smaak goed tot zijn recht in een rumpot

Herkomst	Zweden
Ouderdom	1925
Synoniemen	
Aanplant	1993
Boom	Matig tot sterke groeier
Gebruik	Verse consumptie, ook geschikt voor compote en jam
Bloeitijd	April
Bloem	Wit
Bestuiver	Anna spath, Reine Victoria
Plukrijp	Eind juli - begin augustus
Gebruikstijd	Eind juli - begin augustus
Bewaren	
Vrucht	Tamelijk tot midden groot
Kleur	Paarsrood-blauwrood met geel
Vruchtvlees	Geelgroen en sappig, zeer goed van smaak
Kelk	
Steel	
Steen	Ligt los in het vlees



Bron: <https://fruitpluktuin.nl/fruit/Pruim/opal>

